

MET4 - Eksamen V18

Ved alle flervalgsoppgaver er minst ett svaralternativ riktig. På grunn av avrunding i mellomregninger kan du ha regnet riktig selv om du ikke finner svaret som et alternativ. Velg da det alternativet som er nærmest ditt svar. Kritiske verdier er hentet fra tabellene i læreboken. Dersom du ikke finner eksakt riktig antall frihetsgrader i tabellen, rund av til nærmeste oppgitte verdi.

Oppgave 1

Kursevalueringer er viktige verktøy når universiteter og høyskoler skal forbedre sitt undervisningstilbud. I en typisk evaluering vurderer studentene blant annet hvor fornøyd de er med kurset på en skala fra 1 til 5. I en studie fra 2005 samlet en gruppe forskere inn data fra 463 slike evalueringer ved et universitet i Texas, USA, og vi skal i denne oppgaven se nærmere på dette datasettet.

I tabellen under finner du deskriptiv statistikk for den gjennomsnittlige studentvurderingen for kurs med henholdsvis mannlig og kvinnelig foreleser.

Tabell 1: Deskriptiv statistikk

Kjønn	Min	Median	Max	Gj.snitt	St.avvik	Antall
Menn	2.1	4.15	5	4.07	0.56	268
Kvinner	2.3	3.9	4.9	3.9	0.54	195

(a) Test om studentevalueringen for menn og kvinner har lik varians på 5% signifikansnivå.

1. Hvilken test må vi benytte i dette tilfellet?

- Z -test (vi må slå opp i tabell for standard normalfordeling for å finne kritisk verdi)
- t -test (vi må slå opp i tabell for t -fordelingen for å finne kritisk verdi)
- χ^2 -test (vi må slå opp i tabell for kjikvadratfordelingen for å finne kritisk verdi)
- F -test (vi må slå opp i tabell for F -fordelingen for å finne kritisk verdi)
- Wilcoxon's rangsumtest
- Variansanalyse

2. Hva er verdien på testobservatoren?

- 1.01 0.99 1.08 1.32 0.76 0.93

3. Hva er kritisk verdi for testen?

- 1.44 1.32 0.69 2.19 0.76 0.85 1.18

4. Hva er konklusjonen?

- Ikke forkast nullhypotesen om lik varians på 5% signifikansnivå
- Forkast nullhypotesen om lik varians på 5% signifikansnivå

(b) Test om studentevalueringen for menn og kvinner har lik forventning på 5% signifikansnivå.

1. Hvilken test må vi benytte i dette tilfellet?

- Z -test (vi må slå opp i tabell for standard normalfordeling for å finne kritisk verdi)
- t -test (vi må slå opp i tabell for t -fordelingen for å finne kritisk verdi)
- χ^2 -test (vi må slå opp i tabell for kjikvadratfordelingen for å finne kritisk verdi)
- F -test (vi må slå opp i tabell for F -fordelingen for å finne kritisk verdi)
- Wilcoxons rangsumtest
- Variansanalyse

2. Hva er verdien på testobservatoren?

- 5.94
- 1.28
- 3.28
- 1.64
- 3.01
- 1.78
- 2.28

3. Hva er kritisk verdi for testen?

- 1.28
- 2.01
- 1.96
- 1.78
- 2.28
- 2.10
- 1.58

4. Hva er konklusjonen?

- Ikke forkast nullhypotesen om lik forventningsverdi på 5% signifikansnivå
- Forkast nullhypotesen om lik forventningsverdi på 5% signifikansnivå

(c) Normalfordelingen er en viktig ingrediens i den statistiske analysen i spørsmål a og b. La X_1, \dots, X_n være et utvalg av stokastiske variable og la $\bar{X}_n = (1/n) \sum_{i=1}^n X_n$. Merk av for alle riktige påstander:

- Fordelingen til de stokastiske variablene X_1, \dots, X_n nærmer seg normalfordelingen når n blir stor.
- Fordelingen til \bar{X}_n nærmer seg normalfordelingen når n blir stor.
- Dersom n er stor kan vi på grunn av sentralgrenseteoremet benytte t -test for inferens om et gjennomsnitt, selv om observasjonene ikke er eksakt normalfordelt.
- Det er usikkerhet knyttet til om X_1, \dots, X_n er normalfordelt som gjør at absoluttverdien til kritisk verdi for t -testen er større enn absoluttverdi til kritisk verdi for Z -testen.
- Det er usikkerhet knyttet til verdien av standardavviket til X_1, \dots, X_n som gjør at absoluttverdien til kritisk verdi for t -testen er større enn absoluttverdi til kritisk verdi for Z -testen.

I forbindelse med denne studien ble en gruppe studenter bedt om å vurdere *utseendet* til hver foreleser på en skala fra 1 (dårligst) til 10 (best). I første omgang sorterer vi foreleserne i tre grupper basert på sitt utseende: under middels, middels, og over middels. I tabellen under finner du den prosentvise fordelingen av forelesere på de to kjennetegnene *kjønn* og *utseende*, samt de to marginale fordelingene.

Utseende/Kjønn	Mann	Kvinne	SUM
Under middels	0.21	0.11	0.33
Middels	0.22	0.18	0.4
Over middels	0.15	0.12	0.27
SUM	0.58	0.42	1

(d) Test om utseende og kjønn er uavhengige kjennetegn. Bruk 5% signifikansnivå.

1. Hvilken test må vi benytte i dette tilfellet?

- Z -test (vi må slå opp i tabell for standard normalfordeling for å finne kritisk verdi)
- t -test (vi må slå opp i tabell for t -fordelingen for å finne kritisk verdi)
- χ^2 -test (vi må slå opp i tabell for kjikvadratfordelingen for å finne kritisk verdi)
- F -test (vi må slå opp i tabell for F -fordelingen for å finne kritisk verdi)
- Wilcoxon's rangsumtest
- Variansanalyse

2. I hvilket intervall befinner verdien til testobservatoren seg? (Merk at $[a, b)$ betyr intervallet fra og med a til, men ikke med, b).

- $[0, 0.1)$ $[0.1, 0.5)$ $[0.5, 1)$ $[1, 5)$ $[5, 10)$ $[10, 20)$ $[20, \infty)$

3. Hva er kritisk verdi for testen?

- 0.10 1.69 2.83 5.99 7.38 12.6 14.4

4. Hva er konklusjonen?

- Ikke forkast nullhypotesen om uavhengige kjennetegn på 5% signifikansnivå
- Forkast nullhypotesen om uavhengige kjennetegn på 5% signifikansnivå

I tillegg til gjennomsnittlig tilfredshet, samt kjønn og utseende på foreleser, ble det i denne studien samlet inn flere kjennetegn for hvert kurs, og vi skal nå bruke regresjonsanalyse til å undersøke i hvilken grad disse forklarer variasjon i studentevalueringene. I tabellen under finner du en beskrivelse av variablene i datasettet vårt. Vi har totalt $N = 463$ observasjoner.

Tabell 2: Beskrivelse av variabler

Variabelnavn	Beskrivelse
<code>eval</code>	Gjennomsnittlig poeng på spørsmålet «Hvordan vil du vurdere dette kurset på en skala fra 1 til 5, der 1 er “svært lite tilfredsstillende” og 5 er “utmerket”?»
<code>minority</code>	Dummyvariabel som tar verdien 1 dersom foreleser er medlem av en minoritetsgruppe (dvs. er ikke-hvit).
<code>age</code>	Alder til foreleser.
<code>female</code>	Dummyvariabel som tar verdien 1 dersom foreleser er kvinne.
<code>beauty</code>	Seks bachelorstudenter har vurdert forelesers utseende på en skala fra 1 (dårlig utseende) til 10 (bra utseende). Variabelen i datasettet vårt er et gjennomsnitt av disse vurderingene, og standardisert slik at det totale gjennomsnittet er lik null.
<code>native</code>	Dummyvariabel som tar verdien 1 dersom foreleser har tatt sin høyere utdanning i et engelskspråklig land.

I en statistisk programpakke gjennomfører vi en multipl regressjon med `eval` som responsvariabel. Resultatet av analysen ser du i utskriften under.

```
Call:
lm(formula = eval ~ female + beauty + minority + native + age,
    data = kurs)
```

```
Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.87797 -0.35784  0.04323  0.37956  1.02073
```

```
Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  3.928190   0.179292  21.909 < 2e-16 ***
female      -0.207452   0.052563  -3.947 9.17e-05 ***
beauty       0.140942   0.032938   4.279 2.29e-05 ***
minority    -0.044374   0.075725  -0.586 0.55817
native       0.313490   0.108630   2.886 0.00409 **
age         -0.002707   0.002750  -0.984 0.32545
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
Residual standard error: 0.5324 on 457 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.08919,    Adjusted R-squared:  0.07922
F-statistic:  8.95 on 5 and 457 DF,  p-value: 4.001e-08
```

(e) Gi en kortfattet fortolkning av regresjonsutskriften over. Forklar spesielt betydningen av koeffisienten til *female* og *beauty*.

(f) Kommenter kort diagnoseplottene til regresjonsanalysen, som er gitt i Figur 1.

Du får oppgitt at minste og største observerte verdi av variabelen *beauty* er -1.45 og 1.97 henholdsvis.

(g) Bruk regresjonsmodellen over til å beregne forventet forskjell i studentevaluering for to forelesere med henholdsvis laveste og høyeste verdi av variabelen *beauty*, men som utover det er helt like.

1. Hva blir svaret?

0.08 0.17 0.32 0.48 0.61 0.72 1.03 0.14

I en nylig offentliggjort stortingsmelding («Kultur for kvalitet i høyere utdanning») skriver Kunnskapsdepartementet tydelig at *undervisning skal versettes høyere* ved norske læresteder.

Rektor ved en norsk høyskole har tatt til seg denne oppfordringen, og ønsker å bruke studentevalueringer som et (av flere) mål på undervisningskvalitet, som igjen skal brukes til å belønne gode forelesere med bonus og høyere lønn.

(h) Bruk analysene du har gjort over til å formidle eventuelt relevante funn til den aktuelle rektoren. Skriv et kort notat, vær *presis* og bruk *tall*.

Kilde: Hamermesh og Parker, *Beauty in the classroom: instructor's pulchritude and putative pedagogical productivity*, Economics of Education Review (2005).

Oppgave 2

Den *effisiente markedshypotesen* sier at en investor ikke vil kunne tjene penger på å predikere aksjekurser, fordi prisen på en aksje på et gitt tidspunkt reflekterer all tilgjengelig informasjon om den videre prisutviklingen. Hvorvidt hypotesen holder i praksis har vært gjenstand for betydelig forskning de siste tiårene, og er til syvende og sist et empirisk spørsmål.

Vi skal i denne oppgaven se på noen ulike modeller for å predikere avkastningen i det norske aksjemarkedet på månedlig basis.

Vi begynner med å se på tidsrekken $r_{NO,t}$ som representerer den månedlige avkastningen i prosent i den norske aksjemarkedet (Engelsk: Total market return) *utover* det man ville fått ved å sette pengene i banken (som historisk har vist seg å være en tilnærmet risikofri investering). Dersom vi for eksempel oppnår 2.1% avkastning i aksjemarkedet en måned, og den samme måneden ville fått 0.5% rente av banken, vil vi denne måneden observere $r_{NO,t} = 0.021 - 0.005 = 0.016$.

Vi har observert avkastningen i det norske aksjemarkedet hver måned fra og med januar 1986 til og med februar 2018, totalt 385 måneder. I Figur 2 har vi plottet de estimerte autokorrelasjonene for denne tidsrekken. De blå stiplede linjene markerer grensen for når de estimerte autokorrelasjonene er signifikant forskjellig fra null på 95% signifikansnivå.

Vi ser i autokorrelasjonsplottet at den første estimerte autokorrelasjonen, $\hat{\rho}_1$, såvidt er signifikant forskjellig fra null.

(a) Merk av for alle riktige påstander:

- Det kan se ut som at verdien av $r_{NO,t-1}$ påvirker utfallet av $r_{NO,t}$ kausalt.
- Det kan se ut som at $r_{NO,t-1}$ er korrelert med $r_{NO,t}$.
- Det er en svak tendens i tidsrekken at dersom $r_{NO,t-1}$ er stor, vil også $r_{NO,t}$ være stor.
- Det er en svak tendens i tidsrekken at dersom $r_{NO,t-1}$ er liten, vil også $r_{NO,t}$ være liten.
- Autokorrelasjonsplottet er forenelig med at $r_{NO,t}$ følger en MA(1)-prosess.
- Autokorrelasjonsplottet er forenelig med at $r_{NO,t}$ følger en AR(1)-prosess.
- Selv for en tidsrekke som består av uavhengige observasjoner, er ikke alle autokorrelasjoner nødvendigvis lik null.
- Dersom alle autokorrelasjonene til en tidsrekke er lik null kan det være snakk om hvit støy.

(b)

Vi ønsker å undersøke om vi kan predikere $r_{\text{NO},t}$ én måned frem i tid, og setter opp en AR(1)-modell:

$$r_{\text{NO},t} = \mu + \phi r_{\text{NO},t-1} + u_t. \quad (1)$$

Her er μ og ϕ en ukjent parameter, og u_t er hvit støy med $E(u_t) = 0$ og $\text{Var}(u_t) = \sigma^2$.

1. Forklar hvorfor den første estimerte autokorrelasjonen $\hat{\rho}_1$ er en naturlig estimator for den ukjente parameteren ϕ i ligning (1).

Hint: Betrakt AR(1)-prosessen som en enkel regresjonsmodell $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$, der $Y = r_{\text{NO},t}$ og $X = r_{\text{NO},t-1}$.

Uansett om du fikk til spørsmål 1 eller ikke, kan du nå ta for gitt at den første autokorrelasjonen $\hat{\rho}_1$ er en naturlig estimator for ϕ .

2. Kan du ut fra dette resultatet og autokorrelasjonsplottet i spørsmål (a) vurdere om den effisiente markedshypotesen har vært oppfylt i det norske aksjemarkedet i den aktuelle tidsperioden?

En vanlig modell for å predikere avkastingen i det norske aksjemarkedet en måned frem i tid (utover den risikofrie renten) er å bruke den norske rentesatsen på kortsiktige statsobligasjoner (engelsk: treasury bills, symbol: $\text{bill}_{\text{NO},t}$ og aksjemarkedets utbytte (engelsk: dividend yield, symbol: $\text{d}_{\text{NO},t}$ i inneværende måned som forklaringsvariable i regresjonsmodellen

$$r_{\text{NO},t} = \beta_0 + \beta_1 \text{bill}_{\text{NO},t-1} + \beta_2 \text{d}_{\text{NO},t-1} + \epsilon_t. \quad (2)$$

Vi har månedlige data på disse variablene over den samme tidsperioden som over, som vi bruker til å estimere β_0 , β_1 og β_2 ved hjelp av minste kvadraters metode i en statistisk programpakke. Estimaten finner du i Analyse (1) i regresjonstabellen gitt under:

(c) Vi ser at verken β_1 eller β_2 er signifikant forskjellige fra null i kolonne (1) i analysen over. Gjennomfør heller følgende test på 5% signifikansnivå: $\mathbf{H}_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ mot \mathbf{H}_A : Minst én av koeffisientene er forskjellig fra null.

1. Hvilken test må vi benytte i dette tilfellet?

- Z -test (vi må slå opp i tabell for standard normalfordeling for å finne kritisk verdi)
- t -test (vi må slå opp i tabell for t -fordelingen for å finne kritisk verdi)
- χ^2 -test (vi må slå opp i tabell for kjikvadratfordelingen for å finne kritisk verdi)
- F -test (vi må slå opp i tabell for F -fordelingen for å finne kritisk verdi)
- Wilcoxon's rangsumtest

Tabell 3

<i>Responsvariabel:</i>		
	$r_{NO,t}$	
	(1)	(2)
$bill_{NO,t-1}$	-0.090 (0.092)	-0.065 (0.092)
$d_{NO,t-1}$	0.132 (0.353)	0.216 (0.353)
$r_{US,t-1}$		0.184** (0.077)
Konstantledd	0.004 (0.014)	-0.001 (0.014)
Ant. observasjoner	385	385
R ²	0.004	0.019
Justert R ²	-0.001	0.011
St. avvik residualer	0.068 (df = 382)	0.068 (df = 381)
F-observator	0.857 (df = 2; 382)	2.487* (df = 3; 381)
<i>Merknad:</i>	«df» = «degrees of freedom», *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01	

2. I hvilket intervall ligger verdien på testobservatoren?

[0, 0.1) [0.1, 0.5) [0.5, 1) [1, 5) [5, 10) [10, 20) [20, ∞)

3. I hvilket intervall ligger kritisk verdi for testen?

[0, 0.1) [0.1, 0.5) [0.5, 1) [1, 5) [5, 10) [10, 20) [20, ∞)

4. Hva blir konklusjonen?

Ikke forkast nullhypotesen om at begge regresjonskoeffisientene er lik null på 5% signifikansnivå.

Forkast nullhypotesen om at begge regresjonskoeffisientene er lik null på 5% signifikansnivå

(d)

I en studie som ble publisert i 2013 konkluderte en gruppe forskere at avkastningen i det *amerikanske* aksjemarkedet i måned t (som skrives $r_{US,t}$) er en viktig forklaringsvariabel for den påfølgende måneds avkastning i mange andre lands aksjemarkeder. Vi undersøker om dette også gjelder Norge ved å legge til $r_{US,t-1}$ som forklaringsvariabel i regresjonsmodellen fra forrige oppgave:

$$r_{NO,t} = \beta_0 + \beta_1 bill_{NO,t-1} + \beta_2 d_{NO,t-1} + \beta_3 r_{US,t-1} + \epsilon_t. \quad (3)$$

Ved å bruke data over samme periode som tidligere i analysen kan vi estimere koeffisientene β_0 , β_1 , β_2 og β_3 i denne modellen ved hjelp av minste kvadraters metode. Resultatet ser du i kolonne (2) i regresjonsutskriften over.

Du får videre oppgitt at verdien av de tre forklaringsvariablene i den siste måneden i datasettet vårt er gitt som følger

	$bill_{NO,t}$	$d_{NO,t}$	$r_{US,t}$
$t = \text{FEBRUAR } 2018$	0.0086	0.037	0.023

1. Anta at feilleddet ϵ_t i regresjonsmodellen over er normalfordelt, og at modellen sammen med koeffisientene i kolonne (2) i regresjonstabellen representerer den *sanne* sammenheng mellom forklaringsvariablene og responsvariabelen. Bruk dette til å estimere sannsynligheten for at det i mars 2018 vil lønne seg å investere i en aksjeportefølje som følger den norske totalavkastningen, fremfor å sette pengene i banken.

I hvilket intervall ligger resultatet?

- [0, 0.1]
 [0.1, 0.2]
 [0.2, 0.3]
 [0.3, 0.4]
 [0.4, 0.5]
 [0.5, 0.6]
 [0.6, 0.7]
 [0.7, 0.8]
 [0.8, 0.9]
 [0.9, 1]

2. Dersom du fikk til spørsmål 1, forklar med ord og evt. enkle formler hvordan du kom frem til svaret. Dersom du ikke fikk til spørsmål 1, gi likevel en kort forklaring på hvilke steg du mener må gjøres for å komme frem til riktig svar.


(e)

Når vi tester om en estimert regresjonskoeffisient er signifikant forskjellig fra null, tester vi vanligvis nullhypotesen $H_0 : \beta = 0$ mot det tosidige alternativet $H_A : \beta \neq 0$ på 5% signifikansnivå. I forskningsrapporten som ligger til grunn for denne oppgaven gjennomfører man derimot *ensidige* tester $H_0 : \beta = 0$ mot $H_A : \beta > 0$ på 10% nivå.

1. På hvilken måte forandrer det utfallet av analysene vi har gjort i denne oppgaven?


- Ved å gjennomføre ensidige tester på 10% signifikansnivå blir kritisk verdi for testene mindre; både fordi man samler all usikkerhet i øvre hale av normal- eller t -fordelingen, og fordi signifikansnivået er større. Det samme datamaterialet kan da potensielt gi *flere* forkastninger.
- Ved å gjennomføre ensidige tester på 10% signifikansnivå blir kritisk verdi for testene større; både fordi man samler all usikkerhet i øvre hale av normal- eller t -fordelingen, og fordi signifikansnivået er større. Det samme datamaterialet kan da potensielt gi *færre* forkastninger.
- Ved å gjennomføre ensidige tester på 10% signifikansnivå blir testresultatet nøyaktig det samme; å doble signifikansnivået, og å gjøre ensidige i stedet for tosidige tester har eksakt motsatt effekt for symmetriske fordelinger som normal- og t -fordelingen. Kritiske verdier forblir uforandret.
- Det vil være situasjonsbetinget. Vi har ikke nok informasjon til å svare generelt på dette spørsmålet.

Kilde: Rapach, Strauss og Zhou, *International Stock Return Predictability: What Is the Role of the United States?*, The Journal of Finance (2013).



Figur 1: Diagnoseplott for regresjonsanalysen i Oppgave 1.

ACF, avkastninger Norge , Januar 1986 – Februar 2018



Figur 2: ACF